

**Stanowisko Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego  
w sprawie szczepienia przeciw  
SARS-CoV-2 u pacjentów z przewlekłą  
chorobą nerek, w tym osób dializowanych  
oraz po przeszczepieniu nerki**



**P o l s k i e  
T o w a r z y s t w o  
N e f r o l o g i c z n e**

**W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH**

Czy osoby z chorobami nerek, dializowani oraz pacjenci po przeszczepieniu należą do grupy ryzyka zachorowania na COVID-19?

**TAK**

Te osoby należą do grupy **zwiększonego ryzyka cięższego przebiegu COVID-19**, a nawet zgonu z powodu infekcji.

Czy istnieje szczepionka przeciwko SARS-CoV-2?

**TAK**

Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 **wyzwała produkcję przeciwciał i stymuluje komórki odpornościowe** do ochrony przed chorobą. Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania u osób od 16. roku życia. Schemat szczepienia obejmuje podanie domięśniowo 2 dawek szczepionki w odstępie 21-28 dni.

Czy szczepionka jest skuteczna?

Czy szczepionka jest bezpieczna?

**TAK**

**Skuteczność szczepionki wynosi 95%** u osób, które nie chorowały na COVID-19, skuteczność u ozdrowieńców to 94,6%.

**TAK**

Wszystkie badania kliniczne nad zarejestrowanymi szczepionkami wskazują na ich **bezpieczeństwo**.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po szczepieniu?

Objawy, które mogą wystąpić po szczepieniu to bolesność w miejscu wkłucia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, ból stawów i gorączkę. Objawy te miały charakter przemijający.

U pacjentów **hemodializowanych trzeba wziąć pod uwagę możliwość powstania krwiaka po iniekcji domięśniowej** (w związku z otrzymywaniem heparyny).

Czy istnieją przeciwwskazania do szczepienia?

Szczepienie jest **przeciwwskazane u chorych z wywiadem ciężkiej reakcji anafilaktycznej**.

Aktualny stan zdrowia, choroby oraz przyjmowane leki należy szczegółowo omówić z lekarzem kwalifikującym do szczepienia.

**Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego rekomenduje szczepienie przeciwko COVID-19 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, przyjmujących leki immunosupresyjne w leczeniu kłębuszkowych zapaleń nerek, u chorych dializowanych oraz po transplantacji nerki.**